

برنامه جلوگیری خونریزی بعد از ولادت

سالانه یک تعداد زیاد مادران در اثر خونریزی بعد از ولادت جان شیرین خود را از دست می‌دهند.



۱ بهترین راه جلوگیری از خونریزی بعد از ولادت این است که مادران در یکی از مراکز صحتی ولادت نمایند.

۲ اگر رفتن به مرکز صحتی ممکن نباشد باید قابله و یا داکتر به منزل دعوت گردد.



۳ اگر مادر مجبور باشد در خانه بدون موجودیت قابله و یا داکتر ولادت نماید باید از گولی ضد خونریزی بعد از ولادت استفاده کند.



خانم‌های حامله سه "گولی ضد خونریزی بعد از ولادت" را فوراً بعد از ولادت طفل و قبل از خروج جوره (پلاستنا) بخورند تا حیات شان نجات داده شود.



۱ گولی ضد خونریزی بعد از ولادت هیچگاه در جریان حاملگی یا پیش از ولادت طفل خورده نشود.

۲ اگر یک مادر حمل دوگانگی و یا چند گانگی داشته باشد گولی ضد خونریزی بعد از ولادت را نباید پیش از ولادت آخرین طفلش بخورد.



۳ اگر با وجود خوردن سه "گولی ضد خونریزی بعد از ولادت" خونریزی شدید موجود باشد، مادر را به مرکز صحتی انتقال دهید.



گولی ضد خونریزی بعد از ولادت را میتوان از نزد کارکن صحتی جامعه دریافت نمود.